

がん種	大腸癌	レジメン名	FOLFIRI+ペバシズマブ(インフューザーポンプ)	1コース日数	14
対象疾患	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌		総コース数	病勢進行まで継続	

	投与順	薬剤	投与量	投与方法	投与時間	投与スケジュール								
						1日目	2日目	3日目	...	...	...	...	14日目	
治療内容	RP1	生食シリンジ	10mL	ワンショット静注		●								
	RP2	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	●								
	RP3	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	初回90分	●								
		生理食塩液	100mL											
	RP4	デキサメタゾン	9.9mg	点滴静注	30分	●								
		生理食塩液	50mL											
	RP5	グラニセトロン	3mg/100mL	点滴静注	30分	●								
	RP6	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間 RP7と同時	●								
		5%ブドウ糖	250mL											
	RP7	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1.5時間 RP6と同時	●								
5%ブドウ糖		250mL												
RP8	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分	●									
	生理食塩液	50mL												
RP9	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	46時間	●									
	生理食塩液	※												
RP10	ヘパリンNaロック	10mL	ワンショット静注				●							
支持療法	day2,3デキサメタゾン8mg内服考慮													
備考	※生食の量はフルオロウラシルの量に応じて調整 ペバシズマブ:尿蛋白2+以上で中止、初回90分、2回目60分、3回目30分投与可 イリノテカン:UGT1A1測定													

休薬完了