

がん種	大腸癌	レジメン名	FOLFIRI+アフリベルセプト(インフューザーポンプ)	1コース日数	14
対象疾患	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌		総コース数	病勢進行まで継続	

	投与順	薬剤	投与量	投与方法	投与時間	投与スケジュール								
						1日目	2日目	3日目	14日目	
治療内容	RP1	生食シリンジ	10mL	ワンショット静注		●								
	RP2	デキサメタゾン	9.9mg	点滴静注	30分	●								
		パロノセトロン	0.75mg											
		生理食塩液	50mL											
	RP3	アフリベルセプト	4mg/kg	点滴静注	1時間	●								
		生理食塩液	100mL											
	RP4	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	●								
	RP5	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	2時間 RP6と同時	●								
		5%ブドウ糖	250mL											
	RP6	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	1.5時間 RP5と同時	●								
		5%ブドウ糖	250mL											
	RP7	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴静注	5分	●								
生理食塩液		50mL												
RP8	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴静注	46時間	●									
	生理食塩液	※												
RP9	ヘパリンNaロック	10mL	ワンショット静注				●							
支持療法	day2,3デキサメタゾン8mg内服考慮													
備考	※生食の量はフルオロウラシルの量に応じて調整 イリノテカン:UGT1A1測定 アフリベルセプト:尿蛋白測定、インラインフィルター使用													

休薬完了