

がん種	大腸癌	レジメン名	CapeOX+ペバシズマブ	1コース日数	21
対象疾患	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌		総コース数	病勢進行まで継続	

	投与順	薬剤	投与量	投与方法	投与時間	投与スケジュール								
						1日目	2日目	3日目	...	14日目	15日目	...	21日目	
治療内容	RP1	生食シリンジ	10mL	ワンショット静注		●								休薬完了
	RP2	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分	●								
	RP3	ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	初回90分	●								
		生理食塩液	100mL											
	RP4	デキサメタゾン	9.9mg	点滴静注	30分	●								
		生理食塩液	50mL											
	RP5	グラニセトロン	3mg/100mL	点滴静注	30分	●								
	RP6	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注	2時間	●								
		5%ブドウ糖	250mL											
	RP7	5%ブドウ糖	50mL	点滴静注	5分	●								
RP8	カペシタピン	※	内服	分2朝夕食後										
支持療法	day2,3デキサメタゾン8mg内服考慮													
備考	ペバシズマブ:尿蛋白2+以上で中止、初回90分、2回目60分、3回目30分投与可 ※カペシタピン用量は下記参照、day1夕～day15朝まで内服 【1000mg/m ² /回】 1.36m ² 未満 2,400mg/日 1.36m ² 以上1.66m ² 未満 3,000mg/日 1.66m ² 以上1.96m ² 未満 3,600mg/日 1.96m ² 以上 4,200mg/日													