

がん種	大腸癌	レジメン名	FOLFOXIRI(インフューザーポンプ)	1コース日数	14
対象疾患	治療切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌		総コース数	病勢進行まで継続	

	投与順	薬剤	投与量	投与方法	投与時間	投与スケジュール								
						1日目	2日目	3日目	14日目	
治療内容	RP1	生食シリンジ	10mL	ワンショット静注		●								
	RP2	デキサメタゾン	9.9mg	点滴静注	30分	●								
		パロノセトロン	0.75mg											
		生理食塩液	100mL											
	RP3	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注	1時間	●								
		5%ブドウ糖	250mL											
	RP4	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注	2時間 RP5と同時	●								
		5%ブドウ糖	250mL											
	RP5	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注	2時間 RP4と同時	●								
		5%ブドウ糖	250mL											
RP6	フルオロウラシル	3000mg/m ²	点滴静注	46時間	●									
	生理食塩液	※												
RP7	ヘパリンNaロック	10mL	ワンショット静注				●							
支持療法	RP2開始時アプレピタント(125mg)内服 day2,3アプレピタント(80mg)内服 day2,3,4,(5)デキサメタゾン8mg内服													
備考	※生食の量は5-FUの量に応じて調整 イリノテカン:UGT1A1測定													

休薬完了